5 juin 1992 **Vol. 5 - N° 22**

Sommaire

Fièvre aphteuse en Namibie 75
Entérite virale du canard (peste du canard) en Malaysia péninsulaire 76
Fièvre charbonneuse au Togo 76
Fièvre aphteuse en Israël 77
Péripneumonie contagieuse bovine en Tanzanie 78

FIEVRE APHTEUSE EN NAMIBIE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 29 mai 1992 du Docteur J.J.H. Shaw, directeur des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, Windhoek :

S. R. - 2 N° 3

Date finale de la période du rapport précédent : 11 mai 1992 (voir *Informations sanitaires*, **5** [19], 66).
Date finale de la période du présent rapport : 27 mai 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 6 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6).
Identification géographique des foyers : dans l'est du district de Kavango.

Derniers détails relatifs aux foyers:

N°	Espèce	Nombre d'animaux présents dans les foyers	Information depuis le dernier rapport			
			Nombre de nouveaux cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1-6	bov	95 411 *	0	0	0	0

* 95 411 = population bovine totale dans le district de Kavango

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau foyer n'a été signalé. Des buffles seraient à l'origine de la maladie.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : la campagne de vaccination a été achevée le 23 mai 1992 dans l'ensemble du district de Kavango. Les exportations de viandes ne sont pas affectées par ce foyer ; le contrôle des déplacements d'animaux est maintenu.

*
* *

ENTÉRITE VIRALE DU CANARD (PESTE DU CANARD) EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 3 juin 1992 du Docteur A.M. Hj Babjee, directeur général des services vétérinaires, ministère de l'agriculture, Kuala Lumpur :

S. R. - 2 N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 7 mars 1992 (voir *Informations sanitaires*, **5** [10], 30).
Date finale de la période du présent rapport : 24 mars 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trois (3).
Identification géographique des foyers : Seberang Perai Selatan, Pinang, par 5° 10' N - 100° 40' E.

Derniers détails relatifs aux foyers:

N°	Espèce	Information depuis le dernier rapport				
		Nombre d'animaux dans les foyers	Nombre de nouveaux cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1	avi	5 200	0	0	5 200	0
2	avi	2 200	0	0	2 200	0
3	avi	1 000	0	0	1 000	0

Diagnostic :
A. *Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause :* herpèsvirus.
B. *Commentaires relatifs au diagnostic :* isolement et identification du virus par l'Institut de recherche vétérinaire d'Ipoh (microscopie électronique et épreuve de pathogénicité).

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : importation illégale de canards reproducteurs mâles à partir d'un pays voisin. Aucun nouveau foyer n'a été signalé.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : vaccination.

*
* *

FIÈVRE CHARBONNEUSE AU TOGO

Texte d'une télécopie reçue le 3 juin 1992 du Docteur Tagba-Baagnan Kagnaya, directeur des services vétérinaires et de la santé animale, ministère du développement rural, Lomé :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 20 avril 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 13 avril 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : deux (2).

Identification géographique des foyers :
1. Tonte, préfecture de Toné (0° 6' E - 10° 50' N)
2. Loko-Mango, préfecture de l'Oti (0° 16' E - 10° 36' N).

Détails relatifs aux foyers :

N°	Espèce	Nombre d'animaux dans les foyers	Nombre de cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1-2	bov	3 000	26	26	0	0

Commentaires concernant l'effectif atteint : bovins de trait.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : quatre personnes sont décédées le 16 mai 1992 à Toné. La maladie est apparue sur des "champs maudits". On avait déjà eu à déplorer une telle épizootie en 1991, au début de la saison des pluies.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : destruction des cadavres ; contrôle des déplacements d'animaux dans les foyers ; interdiction de la consommation de viandes suspectes ; vaccination autour du foyer.

*
* *

FIÈVRE APHTEUSE EN ISRAËL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 3 juin 1992 du Docteur A. Shimshony, directeur des services vétérinaires et de la santé animale, ministère de l'agriculture, Beit Dagan :

S. R. - 2 N° 1

Date finale de la période du rapport précédent : 24 mai 1992 (voir *Informations sanitaires*, **5** [21], 73).
Date finale de la période du présent rapport : 2 juin 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Tel Dan, circonscription de Tsefat, à la frontière nord du pays.

Derniers détails relatifs au foyer :

N°	Espèce	Nombre d'animaux présents dans le foyer	Information depuis le dernier rapport			
			Nombre de nouveaux cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1	bov	486	0	0	0	0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : aucun nouveau foyer n'a été signalé. L'infection est exogène.

PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE EN TANZANIE

Traduction du texte d'un télex reçu le 4 juin 1992 du directeur des services vétérinaires, ministère du développement de l'élevage, Dar Es Salaam :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire.
Date présumée de l'infection primaire : janvier 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Misenyi, région de la Kagera (1° 10' S - 31° 30' E).

Détails relatifs au foyer :

N°	Espèce	Nombre d'animaux dans le foyer	Nombre de cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
1	bov	30 000	3 800	0	0	0

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : la maladie a été introduite à partir d'un pays voisin.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit du foyer, vaccination.

*
* *