

INFORMATIONS SANITAIRES

4 août 1995

Vol. 8 - N° 28

Sommaire

Encéphalopathie spongiforme bovine au Portugal	81
Fièvre aphteuse (virus A) en Malaysia péninsulaire	82

ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE AU PORTUGAL

Traduction du texte de quatre télécopies reçues les 26 juillet et 1^{er} août 1995 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

S. R. - 1

Date de la première constatation de la maladie : 20 avril 1995.

Nombre de foyers distincts à ce jour : dix (10).

Identification géographique des nouveaux foyers :

- 7/95. Vale de Lamas - Baçal, zone d'intervention sanitaire de Bragança, région de Tras os Montes
- 8/95. Carvalhinhos - Durrães - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga, région de l'Entre Douro e Minho
- 9/95. Quintão - Areias de Vilas - Barcelos, zone d'intervention sanitaire de Braga, région de l'Entre Douro e Minho
- 10/95. St^a M^a da Fonte - St^a Eulália, zone d'intervention sanitaire d'Aveiro, région de Beira.

Détails relatifs aux foyers :

N°	Espèce	Nombre d'animaux dans le foyer	Nombre de cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
7/95	bov	20	1	0	1	0
8/95	bov	1	1	0	1	0
9/95	bov	58	1	1	0	0
10/95	bov	50	1	1	0	0

Commentaires concernant l'effectif atteint :

- foyer n° 7/95 : vache âgée de 5 ans.
- foyer n° 8/95 : vache âgée de 6 ans, achetée au Portugal.
- foyer n° 9/95 : vache âgée de 5 ans, achetée en Europe.
- foyer n° 10/95 : vache âgée de 6 ans, d'origine nationale mais dont l'ascendance est inconnue.

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique :

- foyer n° 7/95 : le 11 juillet 1995.
- foyer n° 8/95 : le 7 juillet 1995.
- foyer n° 9/95 : le 7 juillet 1995.
- foyer n° 10/95 : le 14 juillet 1995.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des recherches sont en cours pour déterminer le mode de contamination.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit des élevages atteints et contrôle des déplacements d'animaux ; abattage et destruction par incinération des animaux malades. Lors de l'abattage des animaux restants, l'encéphale, le thymus, la moelle épinière, les amygdales, la rate et les intestins seront systématiquement détruits.

*
* *

FIÈVRE APHTEUSE (VIRUS A) EN MALAYSIA PÉNINSULAIRE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 27 juillet 1995 du Docteur A.M. Babjee, Délégué de la Malaysia auprès de l'OIE, Kuala Lumpur :

S. R. - 2 N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 3 juillet 1995 (voir *Informations sanitaires*, 8 [25], 73).

Date finale de la période du présent rapport : 27 juillet 1995.

Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).

Identification géographique du foyer : station de quarantaine de Padang Besar, Etat de Perlis.

Détails relatifs au foyer :

N°	Espèce	Nbre d'animaux présents dans le foyer	Nombre de cas	Nombre de morts	Nombre d'animaux détruits	Nombre d'animaux abattus
	bov	928	...	0	20	87

Conclusions actualisées sur la nature de l'agent en cause : virus de type A.

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : abattage sanitaire partiel.

Note du Bureau central : ces informations ne concernent que le foyer apparu dans la station de quarantaine de Padang Besar. Aucun nouveau cas n'a été observé à ce jour dans les foyers dus au virus de type Asia 1 signalés dans les *Informations sanitaires*, 8 [22], 65.

*
* *

Erreur! Signet non défini.

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau central de l'Office international des épizooties.