

Sommaire

Peste porcine africaine en Afrique du Sud : dans la zone de contrôle de la maladie	191
Peste porcine classique à Cuba : rapport de suivi n° 2	192

PESTE PORCINE AFRICAINE EN AFRIQUE DU SUD dans la zone de contrôle de la maladie

(Date du dernier foyer signalé précédemment : décembre 1998).

RAPPORT D'URGENCE

Traduction d'informations reçues le 8 août 2001 de la Docteure Emily Mmamakgaba Mogajane, directrice de la production agricole, département national de l'agriculture, Pretoria :

Date du rapport : 8 août 2001.

Nature du diagnostic : clinique et de laboratoire.

Date de la première constatation de la maladie : 17 juillet 2001.

Foyers :

Localisation	Nombre
district de Thabazimbi (24° 44' S – 26° 40' E), province du Nord	1 exploitation

Description de l'effectif atteint : porcs domestiques.

Nombre total d'animaux dans le foyer :

espèce	sensibles	cas	morts	détruits	abattus
sui	30	23	23	7	0

Diagnostic : le propriétaire des porcs a constaté une mortalité dès le 17 juillet 2001. Il en a informé le technicien zoosanitaire local le 29 juillet ; des prélèvements ont alors été effectués pour confirmation du diagnostic en laboratoire.

- A. **Laboratoire ayant effectué le diagnostic :** division des maladies exotiques de l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort.
- B. **Epreuves diagnostiques réalisées :** isolement du virus sur culture de moelle osseuse ; PCR⁽¹⁾.

Epidémiologie :

- A. **Source de l'agent / origine de l'infection :** les porcs ont été en contact avec des phacochères (*Phacochoerus aethiopicus*).
- B. **Mode de diffusion de la maladie :** contact direct.
- C. **Autres renseignements épidémiologiques :** ce foyer est apparu dans la zone sud-africaine de contrôle de la peste porcine africaine.

Mesures de lutte : les mesures sanitaires de rigueur ont été prises.

- tous les porcs présents dans l'élevage ont été détruits ;
- l'exploitation a été mise en interdit jusqu'à fin octobre 2001 ;
- il sera interdit de commercialiser les porcs de ce territoire, que ce soit à des fins de consommation locale ou à des fins d'exportation.

Ce foyer étant apparu dans la zone sud-africaine de contrôle de la peste porcine africaine, il ne remet pas en cause les exportations d'animaux et de produits d'origine animale hors zone de contrôle.

(1) PCR : amplification en chaîne par polymérase.

*
* *

PESTE PORCINE CLASSIQUE À CUBA Rapport de suivi n° 2

Traduction d'informations reçues le 8 août 2001 du Docteur Emerio F. Serrano Ramírez, directeur général de l'Institut de médecine vétérinaire, ministère de l'agriculture, La Havane :

Terme du rapport précédent : 17 juillet 2001 (voir *Informations sanitaires*, **14** [29], 180, du 20 juillet 2001).

Terme du présent rapport : 8 août 2001.

Nouveaux foyers :

Localisation	Nombre
province de Pinar del Río	2
province de Santiago de Cuba	1
province de Guantánamo	1

Nombre total d'animaux dans les nouveaux foyers :

espèce	sensibles	cas	morts	détruits	abattus
sui	472	242	78	361	33

*
* *

Les désignations utilisées dans cette publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau central de l'Office international des épizooties aucune prise de position quant au statut juridique des pays et territoires cités, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les données publiées proviennent, sauf indication contraire, des déclarations que les Administrations vétérinaires de ces pays ou territoires ont faites au Bureau central de l'Office international des épizooties.